

SEMAINE DU 20/01

1 Cours

Endomorphismes d'un espace euclidien

Adjoint d'un endomorphisme d'un espace euclidien Théorème de Riesz : représentation des formes linéaires d'un espace euclidien. Adjoint d'un endomorphisme d'un espace euclidien. Propriétés de l'adjonction : linéarité, adjoint d'une composée, involutivité. Si u est un endomorphisme d'un espace euclidien de base **orthonormée** \mathcal{B} , alors $\text{mat}_{\mathcal{B}}(u^*) = \text{mat}_{\mathcal{B}}(u)^T$. Si F est un sous-espace stable par un endomorphisme u , alors F^\perp est stable par u^* .

Matrices orthogonales Une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est dite orthogonale si $M^T M = I_n$. Une matrice est orthogonale si et seulement si la famille de ses lignes ou de ses colonnes est orthonormée pour le produit canonique. Groupe orthogonal $O_n(\mathbb{R})$. Matrices orthogonales positives et négatives. Groupe spécial orthogonal $SO_n(\mathbb{R})$.

Isométries vectorielles Un endomorphisme d'un espace euclidien est une isométrie vectorielle s'il conserve la norme. Caractérisations des isométries parmi les endomorphismes d'un espace euclidien : conservation du produit scalaire, l'image d'une base orthonormée est une base orthonormée, l'adjoint est égal à l'inverse. Groupe orthogonal $O(E)$. Isométries vectorielles directes et indirectes. Groupe spécial orthogonal $SO(E)$.

Réduction des isométries Orientation d'un \mathbb{R} -espace vectoriel de dimension finie. Les matrices de $SO_2(\mathbb{R})$ sont les matrices de la forme $R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$. Les matrices de $O_2(\mathbb{R}) \setminus SO_2(\mathbb{R})$ sont les matrices de la forme $S(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}$. L'application $\theta \mapsto R(\theta)$ est un morphisme surjectif de $(\mathbb{R}, +)$ dans $(SO_2(\mathbb{R}), \times)$ de noyau $2\pi\mathbb{Z}$. Rotation d'un plan euclidien. Les isométries directes d'un plan euclidien sont les rotations. Les isométries indirectes d'un plan euclidien sont les réflexions. Si un sous-espace vectoriel est stable par une isométrie, son orthogonal l'est également. Réduction d'une isométrie d'un espace euclidien : si $u \in O(E)$, il existe une base orthonormée de E dans laquelle la matrice de u est diagonale par blocs de la forme $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ ou $R(\theta)$. Rotation d'un espace euclidien de dimension 3. Les isométries directes d'un espace euclidien de dimension 3 sont les rotations.

Endomorphismes auto-adjoints et matrices symétriques Définition d'un endomorphisme auto-adjoint. Espace vectoriel $\mathcal{S}(E)$ des endomorphismes auto-adjoints d'un espace euclidien E . Si F est un sous-espace vectoriel d'un espace euclidien E stable par $u \in \mathcal{S}(E)$, alors F^\perp est stable par u . Un endomorphisme est auto-adjoint si et seulement si sa matrice dans une base **orthonormée** est symétrique. Les projecteurs auto-adjoints sont les projecteurs orthogonaux. Théorème spectral pour les endomorphismes auto-adjoints et interprétation matricielle. Endomorphismes auto-adjoints (définis) positifs. Caractérisation spectrale : $u \in \mathcal{S}(E)$ est positif (resp. défini positif) si et seulement si $\text{Sp}(u) \subset \mathbb{R}_+$ (resp. $\text{Sp}(u) \subset \mathbb{R}_+^*$). Matrices symétriques (définies) positives. Caractérisation spectrale : $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est positive (resp. définie positive) si et seulement si $\text{Sp}(M) \subset \mathbb{R}_+$ (resp. $\text{Sp}(M) \subset \mathbb{R}_+^*$).

2 Méthodes à maîtriser

- Connaître les différentes caractérisations des isométries vectorielles : adjoint, conservation du produit scalaire, conservation de la norme.
- Utiliser le lien entre adjonction et transposition.
- Utiliser de préférence des bases orthonormées par défaut.
- Calculer la matrice d'un projecteur orthogonal ou d'une symétrie orthogonale.
- Déterminer si un endomorphisme est une isométrie directe/indirecte via sa matrice dans une base orthonormée ; préciser le cas échéant ses éléments caractéristiques.
- Diagonaliser un endomorphisme auto-adjoint dans une base orthonormée de vecteurs propres.
- Utiliser le fait qu'une matrice symétrique est orthogonalement semblable à une matrice diagonale.

3 Questions de cours

Banque CCP Exercices 63, 66, 68, 92

Retour sur le DS n°7 Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $P_n : x \in \mathbb{R} \mapsto \prod_{k=1}^n \operatorname{ch}\left(\frac{x}{k}\right)$.

1. Montrer que la suite (P_n) converge simplement sur \mathbb{R} . On note φ sa limite.
2. Montrer que φ est continue sur \mathbb{R} .