

DEVOIR SURVEILLÉ N°15

- La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.
- On prendra le temps de vérifier les résultats dans la mesure du possible.
- Les calculatrices sont interdites.

Problème 1 – CCINP PSI 2019 – Théorème de Borel

Objectifs

Dans la partie I, on considère deux exemples de fonctions indéfiniment dérivables sur \mathbb{R} et on s'interroge sur l'existence d'un développement en série entière dans un voisinage de 0 pour ces fonctions. Dans la partie II, indépendante de la partie I, on démontre le théorème de Borel en construisant, pour toute suite réelle $(b_p)_{p \in \mathbb{N}}$, une fonction f indéfiniment dérivable sur \mathbb{R} telle que pour tout $p \in \mathbb{N}$, on ait : $f^{(p)}(0) = b_p$.

I Deux exemples de fonctions indéfiniment dérivables

On considère la fonction f définie sur \mathbb{R} par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t(1-itx)} dt.$$

- 1** Montrer que la fonction f est bien définie sur \mathbb{R} .

Pour tout $p \in \mathbb{N}$, on note $\Gamma_p = \int_0^{+\infty} t^p e^{-t} dt$.

- 2** Pour tout $p \in \mathbb{N}$, justifier l'existence de Γ_p et déterminer une relation entre Γ_{p+1} et Γ_p .
- 3** En déduire, pour tout $p \in \mathbb{N}$, la valeur de Γ_p .
- 4** Montrer que f est indéfiniment dérivable sur \mathbb{R} et déterminer, pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $p \in \mathbb{N}$, $f^{(p)}(x)$.
- 5** En déduire le rayon de convergence de la série entière $\sum_{p \geq 0} \frac{f^{(p)}(0)}{p!} x^p$.
La fonction f est-elle développable en série entière en 0 ?

On considère la fonction g définie sur \mathbb{R} par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, g(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} e^{-k(1-ikx)}.$$

- 6** Montrer que g est indéfiniment dérivable sur \mathbb{R} et déterminer, pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $p \in \mathbb{N}$, $g^{(p)}(x)$.
- 7** Montrer que pour tout $p \in \mathbb{N}$, on a : $|g^{(p)}(0)| \geq p^{2p} e^{-p}$.
- 8** En déduire le rayon de convergence de la série entière $\sum_{p \geq 0} \frac{g^{(p)}(0)}{p!} x^p$.
La fonction g est-elle développable en série entière en 0 ?

II Le théorème de Borel

- 9 Déterminer deux nombres complexes a et b tels que pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\frac{1}{1+x^2} = \frac{a}{x-i} + \frac{b}{x+i}$$

- 10 On considère la fonction ψ définie sur \mathbb{R} par : $\forall x \in \mathbb{R}, \psi(x) = \frac{1}{x-i}$.
Montrer par récurrence que pour tout $p \in \mathbb{N}$ et tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\psi^{(p)}(x) = \frac{(-1)^p p!}{(x-i)^{p+1}}$$

- 11 Déterminer, pour tout $p \in \mathbb{N}$, la dérivée p -ième de la fonction φ_1 définie sur \mathbb{R} par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \varphi_1(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

- 12 Montrer que pour tout $p \in \mathbb{N}$ et tout $x \in \mathbb{R}$, on a : $|(x+i)^{p+1} - (x-i)^{p-1}| \leq 2(1+x^2)^{\frac{p+1}{2}}$.
En déduire que pour tout $p \in \mathbb{N}$ et tout $x \in \mathbb{R}^*$, on a :

$$|\varphi_1^{(p)}(x)| \leq \frac{p!}{|x|^{p+1}}$$

- 13 Pour tout réel α , notons φ_α la fonction définie sur \mathbb{R} par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \varphi_\alpha(x) = \frac{1}{1+\alpha^2 x^2}$$

Montrer que pour tout $p \in \mathbb{N}$ et tout $x \in \mathbb{R}^*$:

$$|\alpha| \cdot |\varphi_\alpha^{(p)}(x)| \leq \frac{p!}{|x|^{p+1}}$$

On considère une suite réelle $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et on lui associe la suite de fonctions $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définies sur \mathbb{R} par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}, u_n(x) = \frac{a_n x^n}{1+n! a_n^2 x^2}$$

- 14 Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $\alpha_n = \sqrt{n!} a_n$. Montrer que pour tout entier $p \geq 0$, tout entier $n \geq p$ et tout réel x , on a :

$$u_n^{(p)}(x) = a_n \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} \frac{n!}{(n-k)!} x^{n-k} \varphi_{\alpha_n}^{(p-k)}(x)$$

- 15 En déduire que pour tout entier $n \geq 0$ et tout entier $p \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, on a : $u_n^{(p)}(0) = 0$, et déterminer $u_n^{(n)}(0)$.

- 16 Montrer que pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, tout entier $p \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ et tout réel x , on a :

$$|u_n^{(p)}(x)| \leq \frac{2^n |x|^{n-p-1} p!}{\sqrt{n!}}$$

- 17 En déduire que la fonction $U = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ est bien définie et indéfiniment dérivable sur \mathbb{R} .

- 18 Montrer que $U(0) = a_0$ et que pour tout entier $p \geq 1$, on a : $U^{(p)}(0) = \sum_{n=0}^{p-1} u_n^{(p)}(0) + p! a_p$.

- 19 Déduire de ce qui précède que pour toute suite réelle $(b_p)_{p \in \mathbb{N}}$, il existe une fonction f indéfiniment dérivable sur \mathbb{R} telle que pour tout $p \in \mathbb{N}$, on ait : $f^{(p)}(0) = b_p$.

Ce résultat est appelé théorème de Borel. Il a été démontré par Peano et Borel à la fin du XIX^e siècle.

Problème 2 – CCINP PSI 2019

Notations et définitions

- soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $(p, q) \in (\mathbb{N}^*)^2$;
- $\mathbb{R}[X]$ désigne l'ensemble des polynômes à coefficients dans \mathbb{R} ; si $P \in \mathbb{R}[X]$, on notera encore P la fonction polynomiale associée ;
- $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ et $\mathcal{M}_p(\mathbb{C})$ désignent respectivement les ensembles des matrices carrées de taille p à coefficients dans \mathbb{R} et dans \mathbb{C} , et $\mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{R})$ et $\mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{C})$ désignent respectivement les ensembles des matrices à p lignes et q colonnes à coefficients dans \mathbb{R} et dans \mathbb{C} ;
- on note I_p la matrice identité de $\mathcal{M}_p(\mathbb{C})$ et 0_p la matrice de $\mathcal{M}_p(\mathbb{C})$ ne comportant que des 0 ;
- on note χ_A le polynôme caractéristique d'une matrice $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{C})$, c'est-à-dire le polynôme $\det(XI_p - A)$;
- étant donnée une matrice $M \in \mathcal{M}_p(\mathbb{C})$, on note $\text{Sp}(M)$ l'ensemble des valeurs propres complexes de M .

Objectifs

Dans la partie I, on détermine les valeurs propres d'une matrice tridiagonale symétrique réelle particulière. On utilise les résultats démontrés dans la I pour résoudre, dans la partie II, un système différentiel.

I Éléments propres d'une matrice

I.A Localisation des valeurs propres

On considère une matrice $A = ((a_{i,j}))_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Soient une valeur propre $\lambda \in \mathbb{C}$ de A et un vecteur

propre associé $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C}) \setminus \{0_{\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})}\}$.

1 Montrer que pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a : $\lambda x_i = \sum_{j=1}^n a_{i,j} x_j$.

2 Soit $i_0 \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $|x_{i_0}| = \max_{j \in \llbracket 1, n \rrbracket} |x_j|$. Montrer que : $|\lambda| \leq \sum_{j=1}^n |a_{i_0,j}|$.

En déduire que :

$$|\lambda| \leq \max_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} \left\{ \sum_{j=1}^n |a_{i,j}| \right\}$$

Soient α et β deux nombres réels. On considère la matrice $A_n(\alpha, \beta) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ définie par :

$$A_n(\alpha, \beta) = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & 0 & \cdots & 0 \\ \beta & \alpha & \beta & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \beta & \alpha & \beta \\ 0 & \cdots & 0 & \beta & \alpha \end{pmatrix}.$$

1 Justifier que les valeurs propres de $A_n(\alpha, \beta)$ sont réelles.

2 Soit $\lambda \in \mathbb{R}$ une valeur propre de $A_n(\alpha, \beta)$. Montrer que :

$$|\lambda| \leq |\alpha| + 2|\beta|.$$

I.B Calcul des valeurs propres de $A_n(\alpha, \beta)$

- 3 En utilisant la question 2, montrer que pour toute valeur propre λ de $A_n(0, 1)$, il existe $\theta \in [0, \pi]$ tel que $\lambda = 2 \cos(\theta)$.

On note U_n le polynôme $\chi_{A_n(0,1)}(2X)$.

- 4 Etablir, pour $n \geq 3$, une relation entre $\chi_{A_n(0,1)}$, $\chi_{A_{n-1}(0,1)}$ et $\chi_{A_{n-2}(0,1)}$.
En déduire, pour $n \geq 3$, une relation entre U_n , U_{n-1} et U_{n-2} .
- 5 Montrer par récurrence sur n que pour tout $\theta \in]0, \pi[$:

$$U_n(\cos(\theta)) = \frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin(\theta)}$$

- 6 Déduire de la question précédente que le spectre de $A_n(0, 1)$ est $\left\{ 2 \cos\left(\frac{j\pi}{n+1}\right) ; j \in \llbracket 1, n \rrbracket \right\}$. Déterminer la multiplicité des valeurs propres et la dimension des sous-espaces propres associés.

Considérons $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et posons $\theta_j = \frac{j\pi}{n+1}$.

- 7 Montrer que pour tout vecteur propre $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ de $A_n(0, 1)$ associé à la valeur propre $2 \cos(\theta_j)$,

on a :

$$\begin{cases} -2 \cos(\theta_j)x_1 + x_2 = 0 \\ \forall k \in \llbracket 2, n-1 \rrbracket, x_{k-1} - 2 \cos(\theta_j)x_k + x_{k+1} = 0 \\ x_{n-1} - 2 \cos(\theta_j)x_n = 0 \end{cases}$$

Soit E l'ensemble des suites réelles $(u_k)_{k \in \mathbb{N}}$ vérifiant la relation de récurrence :

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, u_{k-1} - 2 \cos(\theta_j)u_k + u_{k+1} = 0.$$

- 8 Montrer que E est un espace vectoriel sur \mathbb{R} dont on précisera la dimension.
- 9 Déterminer l'ensemble des suites $(u_k)_{k \in \mathbb{N}} \in E$ telles que $u_0 = u_{n+1} = 0$.
- 10 En déduire l'espace propre de $A_n(0, 1)$ associé à la valeur propre $2 \cos(\theta_j)$.
- 11 En déduire, pour tout $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$, l'ensemble des valeurs propres de $A_n(\alpha, \beta)$ et les espaces propres associés. On distinguera le cas $\beta \neq 0$ du cas $\beta = 0$.

II Système différentiel

II.A Matrices par blocs

On considère A, B, C et D des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que C et D commutent.

- 12 Calculer $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D & 0_n \\ -C & I_n \end{pmatrix}$.

L'objectif des trois prochaines questions est de démontrer la relation :

$$\det \left(\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \right) = \det(AD - BC) \quad (1)$$

- 13** Montrer l'égalité (1) dans le cas où D est inversible.
- 14** On ne suppose plus D inversible. Montrer qu'il existe $p_0 \in \mathbb{N}^*$ tel que pour tout $p \geq p_0$, la matrice $D + \frac{1}{p}I_n$ soit inversible.
- 15** En déduire que l'égalité (1) est également vraie dans le cas où D n'est pas inversible.
- Considérons une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et formons la matrice :

$$N = \begin{pmatrix} 0_n & I_n \\ M & 0_n \end{pmatrix}.$$

- 16** Montrer que $\text{Sp}(N) = \{\mu \in \mathbb{C}; \mu^2 \in \text{Sp}(M)\}$.
- 17** Soient $\mu \in \text{Sp}(N)$ et $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$ un vecteur propre de M associé à la valeur propre μ^2 . Montrer que le vecteur $\begin{pmatrix} x \\ \mu x \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n,1}(\mathbb{C})$ est vecteur propre de N associé à la valeur propre μ .
- 18** Montrer que si M est diagonalisable et inversible, alors N est également diagonalisable et inversible.

II.B Application à un système différentiel dans le cas où $n = 2$

On considère le système différentiel :

$$\begin{cases} x_1'' = -2x_1 + x_2 \\ x_2'' = x_1 - 2x_2 \end{cases} \quad (2)$$

- 19** Déterminer $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ tel que le système (2) soit équivalent au système différentiel du premier ordre

$$X' = BX, \text{ où } X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_1' \\ x_2' \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 0_2 & I_2 \\ A_2(\alpha, \beta) & 0_2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R}).$$

Que déduit-on du théorème de Cauchy quant à la structure de l'ensemble des solutions de ce système ?

- 20** En utilisant la question 16, déterminer les valeurs propres de B et en déduire que B est diagonalisable.

On considère la matrice :

$$D = \begin{pmatrix} -i\sqrt{3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & i\sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & i \end{pmatrix}.$$

- 21** En utilisant la question 17, déterminer une matrice inversible $P \in \mathcal{M}_4(\mathbb{C})$ dont la première ligne ne comporte que des 1 et telle que $B = PDP^{-1}$.

- 22** Déterminer l'ensemble des solutions du système différentiel $Y' = DY$, avec $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix}$.

- 23** Déterminer la solution du système différentiel (2) avec conditions initiales $(x_1(0), x_2(0), x_1'(0), x_2'(0)) = (1, 0, 0, 0)$.