

# TRIGONOMÉTRIE INVERSE

## Bijection et variations

- arcsin est une bijection strictement croissante de  $[-1, 1]$  sur  $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$
- arccos est une bijection strictement décroissante de  $[-1, 1]$  sur  $[0, \pi]$
- arctan est une bijection strictement croissante de  $\mathbb{R}$  sur  $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$

## Parité

$$\arcsin(-x) = -\arcsin x$$

$$\arccos(-x) = \pi - \arccos x$$

$$\arctan(-x) = -\arctan x$$

## Liens avec les fonctions trigonométriques directes

$$\forall x \in [-1, 1], \sin(\arcsin x) = x$$

$$\forall x \in [-1, 1], \cos(\arccos x) = x$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \tan(\arctan x) = x$$

$$\arcsin(\sin x) = x \iff x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

$$\arccos(\cos x) = x \iff x \in [0, \pi]$$

$$\arctan(\tan x) = x \iff x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$$

## Dérivation

$$\forall x \in ]-1, 1[, \arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\forall x \in ]-1, 1[, \arccos'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

## Identités

$$\forall x \in [-1, 1], \sin(\arccos x) = \cos(\arcsin x) = \sqrt{1-x^2}$$

$$\forall x \in [-1, 1], \arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$$

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \text{signe}(x) \frac{\pi}{2}$$

## Graphes

