

Normes

Exercice 1 ★★★

CCP MP 2016

Soient $\alpha_0, \dots, \alpha_n$ des réels distincts ($n \geq 1$). On pose $N(P) = \sum_{k=0}^n |P(\alpha_k)|$. Montrer que N est une norme non euclidienne sur $\mathbb{R}_n[X]$.

Exercice 2 ★★★

On considère un espace euclidien E de produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$ que l'on munit d'une norme N (qui n'est pas nécessairement la norme euclidienne associée au produit scalaire précédent). On note S la sphère unité pour la norme N i.e. $S = \{y \in E, N(y) = 1\}$ et on pose pour $x \in E$

$$N^*(x) = \sup_{y \in S} |\langle x, y \rangle|$$

1. Montrer que l'application N^* est bien définie sur E .
2. Montrer que N^* est une norme sur E .
3. Dans cette question, on suppose que $E = \mathbb{R}^n$ et que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est le produit scalaire usuel sur \mathbb{R}^n . Déterminer N^* lorsque N est la norme $\|\cdot\|_2$, la norme $\|\cdot\|_\infty$ et la norme $\|\cdot\|_1$.

Exercice 3 ★★★

Quelques normes matricielles

Pour $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, on pose

$$\begin{aligned} N_1(A) &= \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^p |A_{i,j}| & N_2(A) &= \max_{1 \leq j \leq p} \sum_{i=1}^n |A_{i,j}| \\ N_3(A) &= \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p A_{i,j}^2} & N_4(A) &= \sqrt{\max \text{Sp}(A^T A)} \end{aligned}$$

1. Montrer que N_1, N_2, N_3 et N_4 sont des normes sur $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$.
2. Montrer que si $n = p$, ce sont des normes d'algèbre sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Exercice 4 ★★

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé.

1. Montrer que pour tout $(x, y) \in E^2$,

$$\|x\| + \|y\| \leq 2 \max\{\|x+y\|, \|x-y\|\}$$

2. Montrer que l'on peut avoir l'égalité même si x et y sont non nuls.
3. Désormais la norme est euclidienne. Montrer que pour tout $(x, y) \in E^2$

$$\|x\| + \|y\| \leq \sqrt{2} \max\{\|x+y\|, \|x-y\|\}$$

Peut-on améliorer la constante $\sqrt{2}$?

Exercice 5 ★★

Comparaison de normes usuelles de \mathbb{K}^n

On pose pour $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$,

$$N_1(x) = \sum_{i=1}^n |x_i| \quad N_2(x) = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2} \quad N_\infty(x) = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$$

Montrer que

$$N_\infty \leq N_1 \leq nN_\infty \quad N_\infty \leq N_2 \leq \sqrt{n}N_\infty \quad N_2 \leq N_1 \leq \sqrt{n}N_2$$

et montrer que chacune de ces inégalités est optimale.

Exercice 6 ★

Soit E un \mathbb{R} -espace vectoriel muni d'une norme $\|\cdot\|$. On se donne $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$. Montrer que l'application

$$N : \begin{cases} \mathbb{R}^n & \longrightarrow \mathbb{R}_+ \\ (\lambda_1, \dots, \lambda_n) & \longmapsto \left\| \sum_{k=1}^n \lambda_k x_k \right\| \end{cases}$$

est une norme sur \mathbb{R}^n si et seulement si (x_1, \dots, x_n) est une famille libre.

Exercice 7 ★★

Soit E un espace vectoriel que l'on munit de deux normes N_1 et N_2 . On définit les deux boules unités $B_1 = \{x \in E, N_1(x) \leq 1\}$ et $B_2 = \{x \in E, N_2(x) \leq 1\}$. Montrer que $N_1 = N_2$ si et seulement si $B_1 = B_2$.

Exercice 8 ★

Soit $f_n : x \in \mathbb{R}_+ \mapsto xe^{-nx}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer $\|f_n\|_\infty$.

Exercice 9 ★

Soit $f_n : x \in \mathbb{R} \mapsto \sin^n(x) \cos(x)$ pour $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer $\|f_n\|_\infty$.

Exercice 10 ★★★**Inégalités de Hölder et Minkowski**

Soient p et q deux nombres réels strictement positifs tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

1. Prouver l'inégalité de Young,

$$\forall (u; v) \in (\mathbb{R}_+^*)^2, uv \leq \frac{u^p}{p} + \frac{v^q}{q}$$

2. Soient x_1, \dots, x_n et y_1, \dots, y_n des réels strictement positifs. Prouver l'inégalité de Hölder,

$$\sum_{k=1}^n x_k y_k \leq \left(\sum_{k=1}^n x_k^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^n y_k^q \right)^{\frac{1}{q}}$$

3. Soient $p > 1$, x_1, \dots, x_n et y_1, \dots, y_n des réels strictement positifs. Prouver l'inégalité de Minkowski,

$$\left(\sum_{k=1}^n (x_k + y_k)^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{k=1}^n x_k^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{k=1}^n y_k^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Convexité**Exercice 11 ★★****Epigraphe**

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ où I est un intervalle de \mathbb{R} . On appelle épigraphe de f l'ensemble

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in I, y \geq f(x)\}$$

Montrer que f est convexe si et seulement si son épigraphe est une partie convexe de \mathbb{R}^2 .

Exercice 12 ★

Soient E et F deux \mathbb{R} -espaces vectoriels ainsi que $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Soit C une partie convexe de E . Montrer que $f(C)$ est une partie convexe de F .

Exercice 13 ★**Matrices stochastiques**

On note \mathcal{S} l'ensemble des matrices *stochastiques* de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, c'est-à-dire l'ensemble des matrices $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ à *coefficients positifs* et telles que

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sum_{j=1}^p M_{i,j} = 1$$

Montrer que \mathcal{S} est une partie convexe de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$.

Distance**Exercice 14 ★★**

On considère E l'espace vectoriel des suites réelles bornées que l'on munit de la norme uniforme. On pose $u : n \in \mathbb{N} \mapsto (-1)^n$. Calculer la distance de u au sous-espace vectoriel F de E formé des suites convergentes.

Exercice 15 ★★

Soit A une partie non vide d'un espace vectoriel normé E . On pose $d(x, A) = \inf_{a \in A} d(x, a)$ pour $x \in E$. Montrer que

$$\forall (x, y) \in E^2, |d(x, A) - d(y, A)| \leq d(x, y)$$

Equivalence de normes

Exercice 16 ★★★

On pose $E = \mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R})$ et pour $f \in E$, $N(f) = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty$.

1. Montrer que N est une norme sur E . N est-elle équivalente à $\|\cdot\|_\infty$?
2. Pour $f \in E$, on pose $N'(f) = |f(0)| + \|f'\|_\infty$. Montrer que N' est une norme et qu'elle est équivalente à N .

Exercice 17 ★★★

Centrale MP 2010

Donner un exemple de deux normes non équivalentes sur un espace vectoriel normé.

Exercice 18 ★★★

Centrale PSI 2010

Soit $E = \mathcal{C}([0, 1])$. Pour $f \in E$, on pose $\|f\|_\infty = \sup_{[0,1]} |f|$ et $\|f\|_2 = \left(\int_{[0,1]} f^2 \right)^{\frac{1}{2}}$.

1. Montrer qu'il existe $b \in \mathbb{R}_+$ tel que $\forall f \in E$, $\|f\|_2 \leq b\|f\|_\infty$.
2. Soit V un sous-espace vectoriel de E de dimension finie. Montrer qu'il existe $c \in \mathbb{R}_+$ tel que $\forall f \in V$, $\|f\|_\infty \leq c\|f\|_2$.
3. Soit V un sous-espace vectoriel de E . On suppose qu'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $\forall f \in V$, $\|f\|_\infty \leq n\|f\|_2$. Montrer que V est de dimension finie et que $\dim V \leq n^2$.

Exercice 19 ★★★

D'après Centrale MP 2006

On note E l'ensemble des fonctions f de classe \mathcal{C}^2 sur $[0, 1]$ telles que $f(0) = f'(0) = 0$. Pour $f \in E$, on pose

$$N_\infty(f) = \sup_{[0,1]} |f| \quad N(f) = N_\infty(f + f'') \quad N_1(f) = N_\infty(f) + N_\infty(f'')$$

1. Montrer que N_∞ , N et N_1 sont des normes sur E .
2. Montrer que N_∞ n'est équivalente ni à N ni à N_1 .
3. Soit $f \in E$. Montrer que pour tout $x \in [0, 1]$,

$$f(x) = \int_0^x \sin(x-t)(f(t) + f''(t)) dt$$

4. Montrer que N et N_1 sont équivalentes.

Exercice 20 ★★

Comparaison de normes usuelles de $\mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{K})$

On pose pour $f \in \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{K})$,

$$N_1(x) = \int_a^b |f(t)| dt \quad N_2(x) = \sqrt{\int_a^b |f(t)|^2 dt} \quad N_\infty(x) = \max_{t \in [a,b]} |f(t)|$$

1. Montrer que

$$N_1 \leq (b-a)N_\infty \quad N_2 \leq \sqrt{b-a}N_\infty \quad N_1 \leq \sqrt{b-a}N_2$$

et montrer que chacune des ces inégalités est optimale.

2. Montrer que ces trois normes ne sont pas équivalentes.

Exercice 21 ★★★

TPE-EIVP MP 2012

On pose pour une partie A de \mathbb{R} et $P \in \mathbb{R}[X]$, $N_A(P) = \sup_{x \in A} |P(x)|$.

A quelle condition nécessaire et suffisante N_A est-elle une norme sur $\mathbb{R}[X]$?

Exercice 22 ★★★

Banque Mines-Ponts MP 2022

Soit $E = \mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R})$. On pose pour tout $f \in E$:

- $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)| \, dx$;
- $N_1(f) = \|f\|_1 + \|f'\|_1$;
- $N_2(f) = |f(0)| + \|f'\|_1$.

1. Montrer que N_1 et N_2 sont des normes.
2. N_1 et N_2 sont-elles équivalentes ?

Exercice 23 ★★

ESTP 1982

On considère une suite réelle (a_n) strictement positive et bornée. On note $E = \mathbb{R}[X]$ l'ensemble des polynômes à coefficients réels.

1. Soit $(P, Q) \in E^2$. On pose $u_n = \frac{a_n}{2^n} P(n)Q(n)$ pour $n \in \mathbb{N}$. Démontrer la convergence de la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$.
2. On pose alors pour $(P, Q) \in E^2$,

$$\langle P, Q \rangle = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{2^n} P(n)Q(n)$$

Montrer que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est un produit scalaire sur E .

3. On suppose maintenant la suite (a_n) positive et non strictement positive. Donner une condition nécessaire et suffisante portant sur la suite (a_n) afin que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ définisse encore un produit scalaire sur E .
4. On suppose maintenant $a_n = 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, et l'on désigne par N_1 la norme euclidienne associée au produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$ correspondant à cette suite particulière (a_n) . Cette norme est-elle équivalente à la norme N_2 définie par

$$\forall P \in E, N_2(P) = \sup_{x \in [0,1]} |P(x)|$$

Suites

Exercice 24 ★★★

Soit E un espace vectoriel normé de dimension finie. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\|u(x)\| \leq \|x\|$ pour tout $x \in E$.

1. Montrer que $E = \text{Ker}(\text{Id}_E - u) \oplus \text{Im}(\text{Id}_E - u)$.
2. Soit $x \in E$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $x_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} u^k(x)$. Montrer que (x_n) converge vers la projection de x sur $\text{Ker}(\text{Id}_E - u)$ parallèlement à $\text{Im}(\text{Id}_E - u)$.

Exercice 25 ★

Soit $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ telle que la suite de terme général A^n converge vers L . Montrer que L est une matrice de projecteur.

Exercice 26 ★★★

CCP MP 2019

Soit E un espace préhilbertien réel muni de son produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$. On note $\|\cdot\|$ la norme associée.On dit qu'une suite $(x_n) \in E^{\mathbb{N}}$ converge *fortement* vers $x \in E$ si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|x_n - x\| = 0$ et que (x_n) converge *faiblement* vers x si $\forall y \in E, \lim_{n \rightarrow +\infty} \langle x_n - x, y \rangle = 0$.

1.
 - a. Montrer que si (x_n) converge faiblement, sa limite est unique.
 - b. Montrer que la convergence forte implique la convergence faible.
2. Montrer que (x_n) converge fortement vers x si et seulement si (x_n) converge faiblement vers x et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|x_n\| = \|x\|$.
3. Montrer que, en dimension finie, ces deux modes de convergence sont équivalents.
4. Donner un contre-exemple en dimension infinie.

Exercice 27 ★★★★★

1. Soit (u_n) une suite à valeurs réelles telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} - u_n = 0$. Montrer que l'ensemble des valeurs d'adhérence de (u_n) est un intervalle.
2. Soit $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ continue et (u_n) définie par $u_0 \in [a, b]$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrer que (u_n) converge si et seulement si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} - u_n = 0$.

Exercice 28 ★

Soit A une matrice antisymétrique réelle telle que $(A^n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge. Montrer que la limite est nulle.

Exercice 29 ★★★

Soit $a \in \mathbb{R}$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $A_n = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{a}{n} \\ \frac{a}{n} & 1 \end{pmatrix}$.

Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n^n = \begin{pmatrix} \cos a & -\sin a \\ \sin a & \cos a \end{pmatrix}$.

Exercice 30 ★★

Soient A le point d'affixe i et B le point d'affixe $-i$. On définit la suite $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de points du plan par M_0, M_1 le milieu de $[AM_0]$, M_2 le milieu de $[BM_1]$, M_3 le milieu de $[AM_2]$, M_4 le milieu de $[BM_3]$ et ainsi de suite.

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Préciser la définition des points M_{2n} et M_{2n+1} .
2. On note, pour tout $n \in \mathbb{N}$, z_n l'affixe de M_n . Montrer que les suites $(z_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(z_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ sont arithmético-géométriques.
3. Etudier la convergence des suites $(M_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$, $(M_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
4. Que dire de la suite $(M_{3n})_{n \in \mathbb{N}}$?

Exercice 31 ★★

Soit $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite complexe telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$z_{n+1} = \frac{z_n + |z_n|}{2}$$

1. On note x_n et y_n les parties réelle et imaginaire de z_n .
 - a. Déterminer une relation de récurrence liant y_n et y_{n+1} . En déduire la limite de (y_n) .
 - b. Déterminer le sens de variation de $(|z_n|)$.
 - c. Déterminer le sens de variation de (x_n) .
 - d. En déduire la convergence de (x_n) . On ne cherchera pas à calculer la limite de cette suite.
 - e. En déduire la convergence de (z_n) . Que peut-on dire de sa limite ?
 - f. Déterminer la limite de (z_n) si $z_0 \in \mathbb{R}_+$ et si $z_0 \in \mathbb{R}_-$.
2. On note r_n le module et θ_n l'argument principal (i.e. appartenant à $] -\pi, \pi[$) de z_n .
 - a. En exprimant z_{n+1} sous forme exponentielle, exprimer d'une part r_{n+1} en fonction de r_n et θ_n et d'autre part θ_{n+1} en fonction de θ_n .
 - b. Déterminer la limite de (θ_n) .
 - c. Soit $\alpha \in] -\pi, 0[\cup] 0, \pi[$. En remarquant que pour $a \neq 0[\pi]$, $\cos a = \frac{\sin 2a}{2 \sin a}$, donner une expression simplifiée de $S_n = \prod_{k=1}^n \cos \frac{\alpha}{2^k}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$. En déduire que (S_n) converge vers $\frac{\sin \alpha}{\alpha}$.
 - d. En déduire la limite de (r_n) puis celle de (z_n) en fonction de r_0 et θ_0 .

Suites extraites**Exercice 32 ★★**

Pour $x \in \mathbb{R}$, on note $\{x\} = x - [x]$ la partie fractionnaire de x . Montrer que la suite $(\{\sqrt{n}\})$ n'admet pas de limite.

Exercice 33 ★★★

ENS Ulm/Lyon PC

Soient $(a_n), (b_n), (c_n)$ trois suites réelles telles que $a_n + b_n + c_n$ tend vers 0 et $e^{a_n} + e^{b_n} + e^{c_n}$ tend vers 3. Montrer que les suites $(a_n), (b_n), (c_n)$ convergent.

Exercice 34 ★★★

Centrale PC 2016

Soient (x_n) et (y_n) deux suites telles que $(x_0, y_0) = (0, 0)$ et

$$\forall n \in \mathbb{N}, \begin{cases} x_{n+1} = \sqrt{7 - y_n} \\ y_{n+1} = \sqrt{7 + x_n} \end{cases}$$

1. Montrer que les suites (x_n) et (y_n) sont bien définies.
2. On suppose que les deux suites convergent. Déterminer rigoureusement leur(s) limite(s) possible(s).
3. Montrer que (x_n) et (y_n) convergent.

Exercice 35 ★★★

Soient (u_n) et (v_n) deux suites de nombres réels et p et q deux entiers naturels impairs tels que

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n + v_n &= 0 \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n^p - v_n^q &= 0 \end{aligned}$$

1. Montrer que les suites (u_n) et (v_n) sont bornées.
2. Que peut-on dire des valeurs d'adhérence des suites (u_n) et (v_n) ?
3. En déduire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$.

Révision suites**Exercice 36 ★★★**

Soient a et b deux réels tels que $0 < a < b$. On définit deux suites (u_n) et (v_n) par :

$$\begin{cases} u_0 = a \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{1}{2}(u_n + \sqrt{u_n v_n}) \\ v_0 = b \\ \forall n \in \mathbb{N}, v_{n+1} = \frac{1}{2}(v_n + \sqrt{u_n v_n}) \end{cases}$$

1. Montrer que les suites (u_n) et (v_n) convergent vers une limite commune $l \in \mathbb{R}$.
2. Soit x et y deux réels tels que $0 < x < y$. Montrer que $\frac{1}{y} \leq \frac{\ln y - \ln x}{y - x} \leq \frac{1}{x}$.
3. Montrer que la suite de terme général $c_n = \frac{v_n - u_n}{\ln v_n - \ln u_n}$ est bien définie puis montrer que la suite (c_n) est constante.
4. En déduire la valeur de l .

Exercice 37 ★★

CCP

On pose pour $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = \int_0^1 |x - t| dt$. On définit une suite (u_n) par $u_0 \in [0, 1]$ et la relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Exprimer $f(x)$ pour $x \in [0, 1]$, pour $x \in]-\infty, 0]$ et pour $x \in [1, +\infty[$.
2. Montrer que $u_n \in [0, 1]$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
3. Montrer que $u_n \in \left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right]$ à partir d'un certain rang.
4. Majorer $|f'|$ sur $\left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right]$. En déduire que (u_n) converge vers une limite finie à déterminer.
5. Que peut-on dire de (u_n) si $u_0 > 1$ ou si $u_0 < 0$?

Exercice 38 ★★**Mines-Télécom (hors Mines-Ponts) MP 2021**

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note (E_n) l'équation $\frac{\ln(x)}{x} = \frac{1}{n}$.

1. Montrer qu'il existe des suites (u_n) et (v_n) telles que, pour n assez grand, u_n et v_n vérifient (E_n) et $0 < u_n < e < v_n$.
2. Montrer que la suite (u_n) converge. On note ℓ sa limite
3. Trouver un équivalent de $u_n - \ell$.

Exercice 39**ENSEA**

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'équation $\cos x = nx$ possède une unique solution $x_n \in [0, 1]$.
2. Déterminer la limite de (x_n) .
3. Etudier la monotonie de (x_n) .
4. Etablir que $x_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n}$.
5. Déterminer un équivalent de $x_n - \frac{1}{n}$.

Séries à valeurs dans un espace vectoriel normé**Exercice 40 ★★**

Soient E un espace vectoriel normé de dimension finie, $k \in [0, 1[$ et $f : E \rightarrow E$ tels que

$$\forall (x, y) \in E^2, \|f(x) - f(y)\| \leq k\|x - y\|$$

Soit $u \in E^{\mathbb{N}}$ telle que $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. En considérant la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_{n+1} - u_n$, montrer que u converge.

Exercice 41 ★**Petites Mines 2016**

Soit $\sum u_n$ une série numérique absolument convergente.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $v_n = \sum_{k=0}^n \frac{u_{n-k}}{2^k}$.

1. Montrer que la série $\sum v_n$ converge et calculer sa somme.
2. Reprendre la question précédente lorsque $\sum u_n$ est une série absolument convergente à termes dans un espace vectoriel normé de dimension finie.

Exercice 42 ★★

Pour $P \in \mathbb{K}_n[X]$, on pose $D(P) = P'$ et $T(P) = P(X+1)$. Il est clair que D et T sont des endomorphismes de $\mathbb{K}_n[X]$. Montrer que $\exp(D) = T$.